

Substanz	Handelsname	Wirkungsweise	Einsatzbereiche	Haltbarkeit des Effekts	Notwendige Anwendungen
Hyaluronsäure (Gel)	<p>Belotero® Intense, Belotero® Basic, Belotero® Soft Hyal System®, ACP®</p> <p>Teosyal Global Action®, Teosyal Deep Lines®, Teosyal First Lines®, Teosyal Ultra Deep®, Teosyal Ultima®</p> <p>Restylane®, Perlane®, Restylane Touch®, Restylane Vital®, Sub Q®, Macrolane™ (Körperbereiche)</p> <p>Viscontour™</p>	Viskoelastisches klares Gel zur Injektion in die verschiedenen Haut- und sogar Unterhautschichten zur Anhebung von feinen, mittleren und tiefen Falten und zur Auffüllung von Gewebedefekten bzw. zur Gesichts- und Körperkonturierung	Nasolabialfalten, Mundwinkelfalten Zornesfalten, Augenringe, Wangenfältchen, zirkuläre Halsfalten, Dekolletéfalten, Knitterhaut, Nasenrückenkorrektur, Gewebsauffüllung im Gesicht: Wangenaufbau, Kinnaufbau, Hohlwangen; und am Körper: Brustvergrößerung, Gesäßmodellierung	4–6 Monate und länger, bis zu 2 Jahren (Macrolane™)	1x bei Hautauffrischung 2–5x (Restylane Vital®, Viscontour™, Hyal System, ACP)
Alginat	Novabel®	Viskoelastisches, kohäsives klares Injektionsmedium zur Injektion in verschiedene Schichten der Unterhaut (z.B. Nasolabialfalten) oder unter die Muskelschicht (z.B. Tränenrinne, Augenringe). Auffüllen von Gewebedefekten im Gesicht. Auffüllen des alternden Handrückens (Handverjüngung)	Tränenrinne, Augenringe, tiefe Nasolabialfalten, tiefe Mundwinkelfalten, Konturdefekte im Gesicht, Volumenverlust am Handrücken	12-36 Monate	1x

Substanz	Handelsname	Wirkungsweise	Einsatzbereiche	Haltbarkeit des Effekts	Notwendige Anwendungen
Polymilchsäure	Sculptra™	Flüssigmedium zur Injektion in die mittleren bis tiefen Unterhautschichten zur Anhebung von mittleren und tiefen Falten und zur Auffüllung von Gewebedefekten bzw. zur Gesichtskonturierung (Wangenaufbau). Hauptindikation: Liquid Lifting	Tiefe Nasolabialfalten, stark abgesunkene Mundwinkelfalten, Dekolletéfalten, Hohlwangen, Fettverluste im Mittelgesicht Liquid Lifting: Wiederherstellung der ursprünglichen Gesichtsfülle und Spannkraft von Haut und Unterhautgewebe	12–24 Monate	2–5x
Kollagen (Schwein)	Evolence™, Evolence Breeze™	Modifiziertes Kollagen vom Schwein ohne wesentliches Allergierisiko zur Injektion in mittlere und tiefere Hautschichten zum Aufbau von mittleren und tiefen Falten	Nasolabialfalten, Mundwinkelfalten, Zornesfalten, Augenringe, Auffüllung von Mittelgesichtsdefekten, Nasenrückenkorrektur	9–15 Monate	1x
Ca-Apatit	Radiesse™	Weißes zähflüssiges Gelmasse zur Injektion in die mittleren bis tiefen Unterhautschichten zur Anhebung von mittleren und tiefen Falten und zur Auffüllung von Gewebedefekten bzw. zur Gesichtskonturierung (Wangenaufbau, Kinnaufbau, Nasenrückenkorrektur)	Nasolabialfalten, Mundwinkelfalten, Auffüllung von Mittelgesichtsdefekten	12–18 Monate	1–2x
Eigenfett		Zur Injektion in die mittleren bis tiefen Unterhautschichten zur Anhebung von tiefen Falten und zur Auffüllung von Gewebedefekten bzw. zur Gesichtskonturierung	Mittlere bis tiefe Nasolabialfalten, Mundwinkelfalten, Mittelgesichtseinsenkungen, Wangenaufbau, Hohlwangen	12–36 Monate und länger	1–2x
Botulinumtoxin A	Xeomin®, Bocouture®, Botox®, Vistabel®	Flüssigstoff zur Injektion direkt in den betreffenden mimischen Muskel zur Aktivitätsminderung, dadurch Entspannung und Ausglättung der Falten	Mimisch bedingte Falten: Zornes- und Stirnfalten, Krähenfüße, hängende Mundwinkel, leichte Schlupflider, Doppelkinnfalten etc.	3–6 Monate, je nach Dosierung	1x (Wirkungseintritt erst nach 3–7 Tagen!)